



Rychlý a dlouhodobý účinek



K-Othrine®
SC 25

- ✓ určený k ochraně proti širokému spektru škodlivého a obtížného hmyzu
- ✓ první účinky se projeví po několika minutách, ale působí až několik týdnů
- ✓ vynikající vydražďovací efekt na ukrytý hmyz
- ✓ jednoduché odměřování, ředění a aplikace

POUŽÍVEJTE BIOCIDY BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE OZNAČENÍ A INFORMACE O PŘÍPRAVKU.
K-Othrine® SC 25 obsahuje deltamethrin - 2,5 %. Copyright of Bayer 2008.

Osvědčená účinná látka

K-Othrine® SC 25 je suspenzní koncentrát, který obsahuje 25 g/l deltamethrinu, který patří mezi nejúčinnější syntetické pyrethroidy. Je tvořen pouze čistým izomerem, tím je zabezpečena maximální insekticidní účinnost.

Formulace přípravku

K-Othrine® SC 25 obsahuje pevné částičky účinné látky, které jsou rozptýleny v kapalině. Částice jsou méně absorbovány a zůstávají tak na ošetřeném povrchu, aniž by na něm zanechaly viditelné stopy, a dostanou se tak snadněji do kontaktu s hmyzem.

Spektrum účinnosti

K-Othrine® SC 25 účinkuje na hmyz rychle, ale současně i dlouhodobě. Pokud není setřen nebo zaprášen zůstává účinný 6-8 týdnů. Působí na všechny běžné druhy hmyzu, které se objevují v obytných prostorech, skladech, potravinářských provozech apod. jako jsou švábi, mravenci, cvrčci, rybenky, zavíječi, skladištní brouci, komáři a další.

Dávkování

K-Othrine® SC 25 se před aplikací u neporézních povrchů ředí vodou v poměru 10 ml přípravku na 1 l vody a následně se postřikují místa výskytu hmyzu v dávce 50 ml/m² plochy. Jestliže se jedná o porézní povrchy je doporučený poměr ředění 5 ml přípravku na 1 l vody a postřik se aplikuje v dávce 100 ml/m² ošetřené plochy.

Jednoduché použití

K-Othrine® SC 25 se jednoduše odměřuje, protože je dodáván v lahvi opatřené dávkovačem, snadno se rozmíchává ve vodě a neucpává trysky. Není klasifikován jako nebezpečný z hlediska toxicity pro člověka, je klasifikován pouze jako nebezpečný pro životní prostředí. Nezanechává viditelné stopy na ošetřeném povrchu.

