

NEPOREX[®] 2 SG

Růstový regulátor, který působí negativně na vývoj larev much. Používá se k hubení much v objektech živočišné výroby i za přítomnosti zvířat.

Obsahuje: účinnou látku 2% cyromazinu t. j. 2-cyclopropylamino-4,6-diamino-s-triazin

POZOR ! MŮŽE OHROZIT ZDRAVÍ PŘI POŽITÍ, NADÝCHÁNÍ, STYKU S POKOŽKOU A SLIZNICEMI! PŘÍPRAVEK NESMÍ BÝT POUŽIT JINAK, NEŽ JE UVEDENO V NÁVODU! UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

NEPOREX[®] je larvicidní přípravek, který jako regulátor růstu a vývoje hmyzu negativně ovlivňuje svlékání muších larev tak, že nedojde k jejich přeměně v kuklu a dospělce. Působí v podestýlce, hnoji, kejďě i ve fermentujících zbytcích krmiv.

NEPOREX[®] 2 SG jsou ve vodě rozpustné granule, které se aplikují přímo suché, nebo po rozpuštění ve vodě kropením, nebo postřikem ručními i motorovými postřikovači.

Návod k použití:

Do nádoby postřikovače, částečně naplněné vodou, se za stálého míchání vsype odvážené množství přípravku. Po doplnění vodou na stanovený objem a důkladném rozmíchání je možno NEPOREX[®] 2 SG aplikovat. Aplikace NEPOREXU[®] 2 SG se provádí jen do okrajových míst podestýlky, kam mouchy kladou vajíčka a kde dochází k vývinu larev. Jsou to místa podél stěn, vedle nebo pod instalacemi, pod žlaby, napáječkami, kolem stěn boxů apod.

Telata a skot na slamnaté podestýlce:

Okrajová místa, kde dochází k vývinu larev ošetřujeme v pásech o šíři cca 50 cm. Ošetření se provádí 1. - 3. den po vyklizení. Na jednu podestýlku je možno aplikovat maximálně jednu dávku Neporexu.

Množství Neporex [®] 2 SG pro ošetření 50 m pásu:		
Vlhká podestýlka	Suchá podestýlka	
Suché granule	Kropení	Postřik
250 g	250 g / 10 litrů vody	250 g / 1-4 l vody

Skot na rošttech:

Ošetřete celou plochu.

Množství Neporex [®] 2 SG pro ošetření 10 m ² plochy	Suché granule	250 g
--	---------------	-------

Prasata na celoroštových podlahách:

Ošetřuje se celá plocha podlahy. První ošetření nejlépe před naskladněním mezi jednotlivými turnusy.

Prasata na částečně roštových podlahách:

Ošetřete celou plochu roštů a místa, kde dochází k hromadění trusu, nebo zbytků krmiva.

Množství Neporex® 2 SG pro ošetření 10 m ² plochy		
suché granule	kropením	postřikem
250 g	250 g / 10 l vody	250 / 1 - 4 l vody

Drůbež:

Ošetřuje se celé trusné zařízení včetně jímek. Nejlepšího výsledku lze docílit, týden po odstanění trusu, kdy vrstva nového není silnější než 10 cm.

Množství Neporex® 2 SG pro ošetření 10 m ² plochy		
suché granule	kropením	postřikem
250 g	250 g / 10 l vody	250 g / 1-4 l vody

Ostatní zemědělské objekty:

Obecně se Neporex® 2 SG aplikuje po 1 - 3 denním navrstvení materiálu. Neporex® 2 SG musí být aplikován rovnoměrně v dávce 250 g / 10 m².

Neporex® 2 SG nepůsobí na dospělé mouchy. Pro okamžitou likvidaci dospělých much je třeba kombinovat ošetření NEPOREXEM® 2 SG s aplikací přípravku ALFACRON®, nebo SNIP®.

Upozornění:

Přípravkem je zakázáno ošetřovat krmiva a zdroje pitné vody. Po aplikaci je nutno umýt žlaby, napaječky a plochy určené k přípravě krmiva, pokud došlo k jejich kontaminaci.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Při práci je nutno se vyvarovat požití, nadýchání a potřísnění pokožky nebo očí.

Při aplikaci je nutno používat ochranný pracovní oděv Unita nebo Lesan, ochranný obličejový štít ŠP15, nebo D-1 s čepcem, gumové rukavice a gumové boty, případně komerčně dostupné schválené ekvivalenty uvedené typové ochrany.. Při ředění postřiku se navíc používá zástěra z PVC nebo z pogumovaného textilu.

Při práci je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po skončení práce je nutno se důkladně omýt.

První pomoc:Při požití

Podat 10 tablet aktivního uhlí + 0,5 l vlažné vody a drážděním hrdla vyvolat zvracení. Pokud je postižený v bezvědomí, zvracení nevyvolávejte.

Postiženého neprodleně dopravit k lékaři.

Při zasažení oka

Vyplacovat velkým množstvím vody po dobu patnácti minut a opět vyhledat lékaře.

Při zasažení pokožky

Odstranit potřísněný oděv a zasažená místa omýt mýdlem a teplou vodou.

Při nadýchání

Vynést postiženého na čerstvý vzduch, zajistit klidovou polohu, chránit před chladem.

Případné otravy je možno konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem - Na bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel: 02/ 24 91 92 93

Skladování:

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých, dobře větraných skladech odděleně od krmiv a potravin.

Při správném skladování v neporušených originálních obalech je doba použitelnosti 5 let od data výroby.

Likvidace obalů a zbytků:

Prázdné obaly se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k recyklaci, nebo se spálí ve schválené spalovně. Zbytky přípravku nesmí zasáhnout zdroje spodních vod ani recipienty povrchových vod.

Výrobce:

Novartis Animal Health Inc., Švýcarsko

Držitel registračního rozhodnutí:

Novartis Czech Republic s.r.o.

V Olšínách 75

100 00 Praha 10

číslo šarže:

datum výroby:

® je ochranná známka firmy Novartis Animal Health Inc.